

PROTOCOLLO UTILIZZO DEBRICHEM

- **Selezione paziente:**

1. Ulcere croniche e/o infette degli arti inferiori
2. Assenza di ischemia critica non rivascolarizzata
3. Assenza di osteomielite sottostante
4. Assenza di ascesso e/o fasciti purulenti che richiedono drenaggio chirurgico
5. Assenza di fistola non esplorata
6. Assenza di ulcera neoplastica

- **Preparazione del paziente:**

1. La procedura può essere eseguita in ambulatorio chirurgico o sala operatoria dipendendo dalle esigenze del paziente o dalla logistica operatoria
2. Nei pazienti con neuropatia grave, la procedura può essere condotta in assenza di analgesia
3. Nel paziente non neuropatico, è richiesta una forma di analgesia che può andare da un impacco topico di crema anestetica (tipo lidocaina 5/10%) per 15 min. ad anestesia spinale
4. Non è richiesta la sospensione dei farmaci anticoagulanti
5. Non è richiesta la somministrazione di terapia antibiotica sistemica a meno che il paziente non abbia segni di setticemia

- **Applicazione del Debrichem**

1. Il paziente viene preparato sul lettino e creato un campo sterile secondo la procedura standard
2. La lesione viene detersa con soluzione fisiologica e garza, rimuovendo eventuali detriti che si staccano spontaneamente
3. La lesione deve essere asciugata completamente con garza
4. Il Debrichem va rapidamente applicato sull'intera superficie dell'ulcera, spalmandolo con un dito esercitando una leggera pressione affinché il prodotto penetri nelle eventuali anfratte
5. Lasciare agire il prodotto per un tempo max di 60 sec.
6. Lavare il tutto con abbondante sol. Fisiologica

7. Strofinare energicamente il fondo dell' ulcera con garza bagnata di fisiologica, rimuovendo per quanto possibile, il materiale dissecato sul fondo dell' ulcera
8. A) protocollo consigliato per pazienti immediatamente dimessi: coprire con garza grassa possibilmente sterile. Applicare medicazione secondaria e bendaggi come di consueto. Rivedere il paziente ambulatoriamente almeno una volta alla settimana, procedendo al cambio medicazione secondo le procedure standard
- B) protocollo consigliato per pazienti candidati ad innesto cutaneo/sostituto dermoepidermico: Applicazione immediata di terapia a pressione negativa usando come filler la schiuma. Cambio vacuum therapy ogni 2/3 gg, sino a raggiungimento della completa granulazione del letto della ferita (solitamente 7/ 10 gg). A quel punto eseguire l' innesto desiderato.
- C) protocollo consigliato per esecuzione single stage Debrichem e innesto cutaneo: Procedere alla completa rimozione del tessuto dissecato dal Debrichem, sino ad esposizione di tessuto vitale e sanguinante. Procedere con l' innesto.

AVVERTENZE:

Come da marchio CE le confezioni sono da considerarsi monouso. Se necessario un percorso sterile per il prodotto si consiglia l' apertura e l' aspirazione con siringa sterile e ago. dimensione minima 18 G. L' eventuale odore sgradevole percepito è legato alla presenza del composto di acido metansolfonico e non è da considerarsi segno di deterioramento del prodotto.